


Stoppen met roken met de BioWave

Door het zappen met de antirook chipkaart kunt u op een eenvoudige manier van het roken afkomen.

Benodigheden:

- BioWave Generator
- 1 chipkaart Anti-roken
- 2 Plate zappers en 2 plate zapper kabels
- 1 set handelektroden t.b.v. de BioWave
- Ampullentestset „Anti-rook-Ampullen“
- Mineral Gold Detox AR



Aansluiting BioWave

- Verbind de eerste plate zapper met de BioWave generator d.m.v. de bijgeleverde korte, rode kabel in de rode aansluiting.
- Verbind hierna de tweede plate zapper met de bijgeleverde korte, rode kabel met de eerste.
- Dan verbind u de tweede plate zapper en de Biowave met de handelektroden d.m.v. de rode en zwarte BioWave kabel met drukknop (zie hierboven).

Methode 1

- Inhaleer een paar keer de rook van uw laatste sigaret en druk deze weer uit.
- Doe de uitgedrukte sigaret in een glas en zet deze op de eerste plate.
- Plaats de 1^e ampul uit de anti rook testset op de tweede plate
- Neem de handelektroden vast in de handen
- Plaats de Anti-rookchip in de BioWave
- Start het anti rook programma met de RUN toets

Er verschijnt in het display AR, voor anti-roken en een tijdsduur van 45 minuten.

Elke toepassing duurt 9 minuten.

De testset Anti-roken bevat vijf verschillende ampullen, die in de onderstaande volgorde, na elke piepton op de tweede plate zapper gelegd moeten te worden,

1. Longen 2. Bloed 3. Lever 4. Darmen 5. Slijmvlies

U wordt door een piepton eraan herinnert om de volgende ampul op de tweede plate te wisselen.

- ➔ Neem tijdens de behandeling 3 x daags 10 druppels Mineral Gold Detox AR
- ➔ Gebruik dit anti-rook programma tweemaal per dag.
- ➔ Bij ontweningsverschijnselen of verlangen naar een sigaret kunt u het programma ook nog tussendoor gebruiken.

Methode 2

Indien u na de behandeling van methode 1 geen effect merkt, kunt u het volgende proberen:

- Leg de uitgedrukte sigaret in een klein glas en zet deze op de eerste plate zapper en geen ampul op de tweede plate zapping.
- Zet de Biowave op Dauerzapp en behandel 21 minuten.

Veel patiënten hebben verschillende blokkaden, waardoor het beter is eerst het ontgiftingsproces in gang te zetten.

- Gaat u hierna terug naar methode 1 voor de uitleiding van de nicotine.

Als u merkt dat het effect weer verminderd gebruikt u nogmaals methode 2. Aangezien methode 2 sterker is, kunt u deze maar 2 maal per week gebruiken

Methode 3

Wanneer de beide voorgaande methoden mislukt zijn, heeft u nog een volgende mogelijkheid.

- U volgt de volledige procedure beschreven in methode 1 met als enige onderscheid dat u de intensiteit verminderd tot 1 Volt.

In de biologie is er een oude wet dat zegt dat kleine prikkels grote werking hebben als grote prikkels niet werken. Het is dus niet zo, dat veel ook veel helpt.

Methode 4

Wanneer geen van de voorgaande methoden werken, is er nog een laatste mogelijkheid.

- U vermeerderd de intensiteit tot maximaal, 15 Volt.

Bij veel patiënten bevinden zich in het bindweefsel substanties zoals PCB die als een isolatiemiddel werken en de stroom met informatie niet doorlaten. Het kan zijn dat deze sterkere stroom deze blokkade doorbreekt.

Als deze methode het gewenste effect heeft, kunt u dit in 1 week 2 maal toepassen en later met grotere tussenposen.

Ter ondersteuning

Om de uitleiding van de gifstoffen te ondersteunen, bevelen wij de volgende middelen aan:

- Multivitaal 3 x daags 4 tabletten
- Omegan 2 x daags 1 capsule

→→ Het is belangrijk om bij deze behandeling per dag minimaal 2 liter gezuiverd (omgekeerd osmose) water drinken.